

プレバソンフロアブル5（農林水産省登録番号 第22464号）

平成30年6月27日現在

適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロントラニリブ [®] ロールを含む農薬の総使用回数
キャベツ	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダ [®] ラノメイガ [®] ネリムシ類 カブ [®] ラハバ [®] チ	100倍	セル成型育苗トレイ 1箱または ペ [®] -ハ [®] -ホ [®] ット1冊 (約30×60cm、 使用土壌 約1.5～4L) 当り0.5L	育苗期後半 ～定植当日	1回	灌注	4回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 散布は3回以内)
	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ハイマダ [®] ラノメイガ [®] ウハ [®] 類	500倍	苗地床 1m ² 当り2L				
	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダ [®] ラノメイガ [®] ウハ [®] 類 オオタバコガ [®]	2000倍	100～300L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	
はくさい	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハイマダ [®] ラノメイガ [®] カブ [®] ラハバ [®] チ	100倍	セル成型育苗トレイ 1箱または ペ [®] -ハ [®] -ホ [®] ット1冊 (約30×60cm、 使用土壌 約1.5～4L) 当り0.5L	育苗期後半 ～定植当日	1回	灌注	
	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダ [®] ラノメイガ [®] カブ [®] ラハバ [®] チ	2000倍	100～300L/10a				
かぶ	コナガ	2000倍	100～300L/10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	3回以内
非結球あぶらな科 葉菜類 (タアサイを 除く)							2回以内
タアサイ	オオタバコガ [®]	100倍	セル成型育苗トレイ 1箱または ペ [®] -ハ [®] -ホ [®] ット1冊 (約30×60cm、 使用土壌 約1.5～4L) 当り0.5L	育苗期後半 ～定植当日	1回	灌注	3回以内 (灌注は1回以内、 散布は2回以内)
あすっこ	アオムシ						1回
アマランサス (茎葉)	シロヒ [®] ノメイガ [®]	2000倍	100～300L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
なばな	アオムシ ハスモンヨトウ						4回以内 (灌注は1回以内、 散布は3回以内)

(つづき)

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	クワントラニリブ [®] ロール を含む農薬の 総使用回数
だいこん	コナガ アオムシ ヨトウムシ	2000倍	100~300L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
はつか だいこん	ハイマダ [®] ラノメイガ [®] カブラハバチ ハモク [®] リバ [®] エ類				1回		1回
カリフラワー	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ				3回以内		4回以内 (灌注は1回以内、 散布は3回以内)
ブロッコリー	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ	100倍	セル成型育苗トレイ 1箱または ペーパーポット1冊 (約30×60cm、 使用土壌 約1.5~4L) 当り0.5L	育苗期後半 ~定植当日	1回	灌注	4回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 散布は3回以内)
	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ハイマダ [®] ラノメイガ [®]	2000倍	100~300L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	4回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 散布は3回以内)
はなっこりー	アオムシ	100倍	セル成型育苗トレイ 1箱または ペーパーポット1冊 (約30×60cm、 使用土壌 約1.5~4L) 当り0.5L	育苗期後半 ~定植当日	1回	灌注	3回以内 (灌注は1回以内、 散布は2回以内)
レタス	ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ	2000倍	100~300L/10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	4回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 散布は3回以内)
	ハモク [®] リバ [®] エ類	1000~ 2000倍			3回以内		
非結球レタス	ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ ハモク [®] リバ [®] エ類 ネキリムシ類 ヒメフタテンヨコバイ	100倍	セル成型育苗トレイ 1箱または ペーパーポット1冊 (約30×60cm、 使用土壌 約1.5~4L) 当り0.5L	育苗期後半 ~定植当日	1回	灌注	4回以内 (灌注は1回以内、 散布は3回以内)
	ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ ハモク [®] リバ [®] エ類	2000倍	100~300L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	
トマト	ハモク [®] リバ [®] エ類	1000~ 2000倍	1株当り25mL	育苗期後半 ~定植当日	1回	灌注	4回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 散布は3回以内)
	オオタバコガ	2000倍					
ミニトマト		100倍	1株当り25mL	育苗期後半 ~定植当日	1回	灌注	4回以内 (灌注は1回以内、 散布は3回以内)
		200倍	1株当り50mL				
		100倍	1株当り25mL				
		200倍	1株当り50mL				
	ハモク [®] リバ [®] エ類 コナジラミ類	2000倍	100~300L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	

(つづき)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クワントリアゾールを含む農薬の総使用回数
なす	ハスモンヨトウ ハモクグリバエ類 ネキリムシ類	100倍	1株当たり25mL	育苗期後半 ～定植当日	1回	灌注	3回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 散布は2回以内)
	ハモクグリバエ類	200倍	1株当たり50mL				
とうがらし類		1000～ 2000倍	100～300L/10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	
	2000倍	3回以内					
ピーマン	ハスモンヨトウ オオタバコガ	1000～ 2000倍	1株当たり25mL	育苗期後半 ～定植当日	1回	灌注	3回以内 (灌注は1回以内、 散布は2回以内)
	ハスモンヨトウ コナジラミ類	100倍					
きゅうり	ハモクグリバエ類	100～ 200倍	1株当たり25mL	収穫前日 まで	3回以内	散布	4回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 散布は3回以内)
		200倍	1株当たり50mL				
	1000～ 2000倍	100～300L/10a					
ウリノメイガ	2000倍						
ズッキーニ	ハモクグリバエ類	1000倍	100～300L/10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	3回以内
メロン すいか	オオタバコガ ハモクグリバエ類	2000倍					
とうがん	ハスモンヨトウ		2000倍	100～300L/10a	収穫7日前 まで	1回	散布
いちご							
パセリ	ヨトウムシ	2000倍	100～300L/10a	収穫3日前 まで	3回以内	散布	3回以内
せり科葉菜類 (パセリを 除く)							
らっきょう	ハモクグリバエ類	100倍	セル成型育苗トレイ 1箱または ペーパーポット1冊 (約30×60cm、 使用土壌 約1.5～4L) 当り0.5L	育苗期後半 ～定植当日	1回	灌注	4回以内 (灌注は1回以内、 散布は3回以内)
ねぎ	シロイソナデ ネギコガ ハモクグリバエ類						
	いんげんまめ	ハスモンヨトウ	4000倍	100～300L/10a	収穫7日前 まで	2回以内	散布
えだまめ	オオタバコガ ハスモンヨトウ マメシクイガ ウコンメイガ	収穫3日前 まで			3回以内		
だいず	ハスモンヨトウ マメシクイガ ウコンメイガ	16～32 倍	0.8L/10a	収穫7日前 まで	2回以内	無人 航空 機に よる 散布	2回以内

(つづき)

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	クロラントラニプロール を含む農薬の 総使用回数						
未成熟 そらまめ	ハモク ^レ リハ ^レ エ類	1000～ 2000倍	100～300L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内						
さやいんげん 実えんどう さやえんどう	ハスモンヨトウ ハモク ^レ リハ ^レ エ類	2000倍											
やまのいも	ハスモンヨトウ カガ ^レ イモガ ^レ	2000倍											
かんしょ	ハスモンヨトウ	2000～ 4000倍											
	カジ ^レ ロシカ ^レ バ	4000倍	0.8～1.6L/10a	無人航 空機に よる 散布									
さといも アスパラガス ほうれんそう モロヘイヤ バジル しそ えごま(葉) ふき	ハスモンヨトウ	2000倍	100～300L/10a	収穫3日前 まで	2回以内	散布	2回以内						
クレソン (土耕栽培)					コガ ^レ		3回以内	3回以内					
ごま	材カ ^レ コガ ^レ	2000倍	100～300L/10a	収穫14日前 まで	2回以内	散布	2回以内						
とうもろこし	アワノメイガ ^レ 材カ ^レ コガ ^レ	2000倍	100～300L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内						
オクラ	材カ ^レ コガ ^レ ハスモンヨトウ												
しょうが	ハスモンヨトウ												
エンサイ													
つるむらさき													
茎ブロッコリー	ハスモンヨトウ							100倍	セル成型育苗トレイ 1箱または ペ ^レ -ハ ^レ -ホ ^レ ット1冊 (約30×60cm、 使用土壌 約1.5～4L) 当り0.5L	育苗期後半 ～定植当日	1回	灌注	4回以内 (灌注は1回以内、 散布は3回以内)
たばこ	ヨウムシ							2000倍	100～180L/10a	収穫10日前 まで	2回以内	散布	2回以内

【成分】 クロラントラニプロール (通称：リナキシピル) 5.0%
水、界面活性剤等 95.0%

【性状】 淡褐色水和性粘稠懸濁液体

効果・薬害等の注意

- 使用前によく振ってから使用してください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 散布液調製後はできるだけ速やかに散布してください。
- 使用量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び使用方法に合わせて調節してください。
- 本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意事項を守ってください。
 - ① 散布は散布機種種の散布基準に従って実施してください。
 - ② 散布に当っては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
 - ③ 散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
- 過度の連用を避け、可能な限り作用性の異なる薬剤やその他の防除手段を組み合わせ使用してください。
- つまみ菜、間引き菜には使用しないでください。
- 空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、環境に影響のないよう適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

安全使用上の注意

- 誤飲などのないように注意してください。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- 本剤は皮ふに対して弱い刺激性があるので皮ふに付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 使用の際は手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して薬剤が皮ふに付着しないよう注意してください。
- 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

- ラベルをよく読んでください。
- 記載以外には使用しないでください。
- 小児の手の届くところには置かないでください。
- 空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、環境に影響のないよう適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。

[プレバソンフロアブル5の製品ページへ戻る](#)