

| 作物名 | 適用 病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | シアントラニプロールを含む農薬 の総使用回数 | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 稲 (箱育苗) | ツマグロヨコバイ イネミスジウメシ イネトモイムシ フタホヒコヤガ ニカメイチユ コブノメイガ イネトムシ | 育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約 5L) 1 箱当り 50g | は種前 | 1 回 | 育苗箱の床土 又は覆土に均 一に混和する。 | 1 回 | |
| | ヒメトビウカ | | は種時 (覆土前) ～移植当日 | | | | |
| | | | 移植 3 日前 ～移植当日 | | | | |
| | イネヒメモグリハエ イナゴ類 | 高密度には種す る場合は 1kg/10a (育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約 5L) 1 箱当り 50～ 100g) | 移植当日 | | | | は種時 (覆土前) ～移植当日 |
| | ツマグロヨコバイ イネミスジウメシ イネトモイムシ フタホヒコヤガ ニカメイチユ コブノメイガ イネトムシ | | 移植 3 日前 ～移植当日 | | | | |
| | | | ヒメトビウカ | | | | |
| イネヒメモグリハエ イナゴ類 | | | | | | | |

[パディート箱粒剤の製品ページに戻る](#)

【成分】 シアントラニプロール（通称：サイアジピル）0.75%

【性状】 類白色細粒

殺虫剤分類

28

効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 本剤を床土または覆土に混和する場合、処理後速やかに使用してください。また、本剤を処理した床土または覆土を放置しないでください。
- 育苗箱（30x60x3cm、使用土壌約 5L）1 箱当りに乾粒として 200 から 300g 程度を高密度には種する場合は、10a 当りの育苗箱数に応じて、本剤の使用量が 1kg/10a までとなるよう、育苗箱 1 箱当りの薬量を 50 から 100g までの範囲で調整してください。
- 育苗箱の上から均一に散布し、軽く灌水してから移植してください。
- ヒメトビウカに対しては残効性に注意してください。
- 空袋は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。

- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

安全使用上の注意

- 散布の際は手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して薬剤が皮ふに付着しないよう注意してください。
- 直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

- ラベルをよく読んでください。
- 記載以外には使用しないでください。
- 小児の手の届くところには置かないでください。
- 空袋は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。
- 防除日誌を記帳しましょう。