

FMC

# コナジラミは止める。 ハチは活かす！

野菜散布用殺虫剤


## ベネビア<sup>®</sup> OD

powered by  
**CYAZYPYR<sup>®</sup>**  
ACTIVE INGREDIENT

令和元年9月  
アザミウマ類に  
適用拡大!



### 1 トマト黄化葉巻病の媒介抑制効果



コナジラミ類  
(タバココナジラミ)

【試験概要】  
 2014年 熊本県農業研究センター内ガラスハウス  
 品 種：りんか409  
 対象害虫：タバココナジラミ バイオタイプQ  
 発 生 量：多発生（罹病株を設置）  
 区 制：1区6株（3複葉/株） 3反復  
 播 種：2月27日  
 定 植：4月15日  
 処 理 日：5月9日、5月16日、5月22日 計3回  
 調 査 日：最終散布18日後



### 2 訪花昆虫に対する高い安全性

マルハナバチに対して  
高い安全性を有します。  
翌日放飼可。



クロマルハナバチ

写真提供：アリスライフサイエンス(株)



## ■適用害虫と使用方法(適用表から一部抜粋)〈色文字が適用拡大部分〉

2019年9月25日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニプロロールを含む農薬の総使用回数
トマト ミニトマト	オオタバコガ	2000～4000倍	100～300 ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は3回以内)
	アブラムシ類 コナジラミ類 <b>アザミウマ類</b> ハモグリバエ類	2000倍					

その他の登録作物：きゅうり、ピーマン、いちご、キャベツ、はくさい、だいこん、ブロッコリー、レタス、**非結球レタス**、えだまめ、だいず、ねぎ、たまねぎ、やまのいも、かんしょ、ばれいしょ、かぼちゃ、**アスバラガス**、**未成熟とうもろこし**、**にんじん**、**さやいんげん**、**オクラ**、**ししとう**、**たばこ**

## 混用事例(トマトのみ抜粋)

本表は実施した試験をもとに作成しておりますが、品種、栽培条件、使用濃度、使用時期などにより結果が異なる場合があります。したがって、本表で「薬害がない」ということを保証するものではありません。あくまでも混用知見の一例として考えていただきますようお願いいたします。 2019年7月5日作成

殺菌剤		殺虫剤		展着剤
アフエット(FL)	セイビアー20(FL)	ベルクート(FL)	アグロスリン(乳)	アブローチBI
エコショット	ダイアメリット(DF)	ベルクート(水)	エコピタ(液)	スカッシュ
オーソサイド80(水)	ダイナモ(WG)	ペンコゼブ(FL)	コテツ(FL)	ニーズ
カーゼートPZ(水)	ダイマジン(水)	ベンレート(水)	コルト(WG)	ブレイクスルー
カリグリーン(溶)	ダコニール1000(FL)	ポトピカ(水)	コロマイト(乳)	まくぴか
カンタス(DF)*	トップジンM(水)	ホライズン(DF)	スタークル/アルパリン(SG)	ミックスパワー
クリーンサポート	トリフミン(水)	ポリオキシシンAL(水)	トレボン(乳)	
ゲッター(水)	ハーモメイト(溶)	ポリオキシシンAL(乳)	ハチハチ(乳)	
サブロール(乳)	パンチョTF(WG)	ポリオキシシンAL(溶)	ベストガード(溶)	
ザンプロDM(FL)	ピクシオ(DF)	モレスタン(水)	マイトコーネ(FL)	
シグナム(WG)	ファンタジスタ(WG)	ライメイ(FL)	モスピラン(溶)	
ジマンダイセン(水)	ファンベル(WG)	ラリー(乳)		
ジャストフィット(FL)	フルピカ(FL)	ランマン(FL)		
ジャストミート(WG)	プロポーズ(WG)	リドミルゴールドMZ		
スミブレンド(水)	ベジセイバー	レーバス(FL)		
スミレックス(水)	ベトファイター(WG)	ロブラール(水)		

※カンタス(DF)については使用直前の混用なら問題なかった。

(乳)	乳剤
(水)	水和剤
(液)	液剤
(溶)	水溶剤
(DF)	ドライフロアブル剤
(FL)	フロアブル剤
(WG)	顆粒水和剤
(SG)	顆粒水溶剤

## 使用の際の注意事項(使用上の注意事項より一部抜粋)

- やむを得ず、他の薬剤と混用する場合には、事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。特に、銅剤との混用は薬害を生じるおそれがあるので、混用はしないでください。
- トマト及びミニトマトに使用する場合、薬害を生じるおそれがあるので、以下のことに注意してください。
  - ①アゾキシストロビンを含む農薬との混用はしないでください。
  - ②アゾキシストロビンを含む農薬を散布した場合には、散布後2週間以上間隔をあけて本剤を使用してください。

●ラベルをよく読んでください。 ●記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かないでください。  
 ●空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、環境に影響のないよう適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。 ●防除日誌を記帳しましょう。

©2019 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC、FMCロゴ、<sup>®</sup>を付した商標は、FMC Corporationまたはその米国およびその他の国の子会社・関連会社の登録商標です。

