

野菜灌注用殺虫剤

FMC

ベジマーク[®] SC


powered by
CYAZYPYR[®]
ACTIVE INGREDIENT



令和元年9月
非結球あぶらな科
葉菜類にも
適用拡大!



**充実した収穫に向けて、
定植前の灌注処理をお忘れなく。**



1 1つの成分で幅広い害虫をカバー。



*1:適用はキャベツ、はくさい、ブロッコリー、カリフラワーのみ
*2:適用はキャベツ、ブロッコリーのみ *3:適用ははくさいのみ

2 約4週間に渡る長期残効で適用作物を守ります。

3 育苗期後半～定植当日まで幅広く使えます。(定植5～3日前が推奨時期です)

■適用害虫と使用方法 適用表より一部抜粋(赤字が適用拡大部分)

2019年9月25日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニリブロールを含む農薬の総使用回数
キャベツ	ハスモンヨトウ アザミウマ類 アブラムシ類 コナガ、アオムシ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ ネキリムシ類 ウワバ類	400倍	セル成型育苗トレイ1箱 またはペーパーポット1冊 (約30×60cm、 使用土壌約1.5～4ℓ) 当り0.5ℓ	育苗期後半 ～定植当日	1回	灌注	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は3回以内)
はくさい	アブラムシ類 コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ カブラハバチ						
ブロッコリー	コナガ、アオムシ ハスモンヨトウ アブラムシ類 アザミウマ類 ハイマダラノメイガ						
レタス	オオタバコガ ハモグリバエ類 ハスモンヨトウ アブラムシ類 ヒメフタテンヨコバイ ウワバ類						
非結球レタス	アオムシ、コナガ ハスモンヨトウ	4000倍	0.2ℓ/m ²	収穫7日前 まで	株元灌注	1回	
カリフラワー	コナガ アブラムシ類						
非結球あぶらな科 葉菜類	コナガ アブラムシ類						

その他の適用作物：きゅうり、トマト、ミニトマト、ピーマン、なす、メロン、すいか、ねぎ、ほうれんそう、いちご、ししとう

△ 効果・薬害等の注意

- 使用前によく振ってから使用してください。
- 使用量に合わせ薬液を調整し、使いきってください。
- 薬液調整後はできるだけ速やかに使用してください。
- アルカリ性の農薬や肥料との混用はさけてください。
- 過度の連用を避け、可能な限り作用性の異なる薬剤やその他の防除手段を組み合わせて使用してください。
- 空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、環境に影響のないよう適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

水で希釈すると残渣が認められることがありますが、品質には影響ありません。

- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

△ 安全使用上の注意

- 誤飲などのないように注意してください。
- 使用の際は手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して薬剤が皮膚に付着しないように注意してください。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養魚池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調整を行い、使いきってください。処理器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

殺虫剤分類 28

殺虫剤抵抗性管理(IRM)

一般推奨事項：薬剤抵抗性の急速な発達を防ぐために、同一作用機構を持つ製品を連続する複数の害虫世代間にわたって処理することは避けること。ブロック式ローテーション、即ち、ベリマーク[®]SC または他のグループ28 殺虫剤の「ブロック」の後に、異なる作用機構を持つ有効な殺虫剤処理の「ブロック」が続く形でローテーションを使用すること。作付期間(播種から収穫まで)を通して適応されるすべての「グループ28 使用ブロック」の合計暴露期間は作付期間の50%を超えてはならない。栽培期間の短い作物は1 栽培期間を1 ブロックとする。IPM手法の一環として防除体系に組み込むこと。

害虫の抵抗性、作用機構及びモニタリングに関する追加情報の参照サイト
(1) Insecticide Resistance Action Committee(IRAC)ウェブサイト[http://www.irac-online.org]
(2) http://www.fmc-japan.com/Agricultural-Solutions/IRAC

●ラベルをよく読んでください。 ●記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かないでください。
●空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、環境に影響のないよう適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。 ●防除日誌を記載しましょう。

©2019 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, FMC ロゴ、[®]を付した商標は、FMC Corporation またはその米国およびその他の国の子会社・関連会社の登録商標です。

