


苗が着いたその日のうちに、灌注・定植。

FMC

野菜灌注用殺虫剤


ベリマーク® SC

powered by
CYAZOPYR®
ACTIVE INGREDIENT



定植後の効果はコレだ!!

■アザミウマ類による生長点の被害率



ベリマーク®SC区



慣行A剤区(アザミウマ類の被害)

👍 いいね!

約3~4週間効果が続く。

👍 いいね!

天敵・有用昆虫に対して安全性が高い。

天敵等に対する影響日数=0日
(日本生物防除協議会一覧表)



スワルスキーカブリダニ



タイリクヒメハナカメムシ

写真提供: アリスタライフサイエンス(株)

適用害虫と使用方法(適用表より一部抜粋)

2019年4月現在

作物名	適用害虫名	使用量		使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数
		薬量	希釈水量				
ピーマン	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類	400株当たり 25ml	400株当たり10~20ℓ (1株当たり25~50ml)	育苗期後半 ~定植当日	1回	灌注	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は3回以内)
トマト ミニトマト	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類 ハモグリバエ類						
きゅうり	ハモグリバエ類 アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類						
なす	コナジラミ類 アブラムシ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類 ネキリムシ類						
メロン すいか	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類						

その他の適用作物：いちご、ほうれんそう、キャベツ、はくさい、ブロッコリー、カリフラワー、レタス、非結球レタス、ねぎ

適用害虫



アザミウマ類
(ミナミキイロアザミウマ)

アブラムシ類
(ジャガイモヒゲナガアブラムシ)

ジアミド系で初登録




コナジラミ類
(タバココナジラミ)

ハモグリバエ類(被害)
適用は「トマト、ミニトマト、
きゅうり、なす」

ネキリムシ類
(カブラヤガ)
適用は「なす」

果菜類の希釈方法

25mlの薬量を10~20ℓの水に希釈して、400株に均一に撒ききるだけ!



※株数によって異なります。

果菜類の希釈早見表

処理する株数	必要薬剤量(ml)	必要水量(ℓ)
80	5	2~4
400	25	10~20
800	50	20~40
1,600	100	40~80
2,000	125	50~100

●ラベルをよく読んでください。 ●記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かないでください。 ●空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、環境に影響のないよう適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。 ●防除日誌を記載しましょう。

©2019 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC、FMCロゴ、®を付した商標は、FMC Corporationまたはその米国およびその他の国の子会社・関連会社の登録商標です。

